

Waarvoor is dit geneesmiddel?

U krijgt dit geneesmiddel bij:

- Suikerziekte (diabetes)

Hoe werkt dit geneesmiddel?

Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed. Dit is schadelijk voor uw hart en bloedvaten, ogen, nieren en zenuwen. Dit geneesmiddel verlaagt de hoeveelheid suiker in uw bloed.

Hoe gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem de tablet met een half glas water.

Neem de tablet **tijdens of vlak na de maaltijd**. Dan veroorzaakt het minder maagdarmklachten.

Kies een vast moment van de dag. Zo vergeet u het minder snel. Bijvoorbeeld:

- Als u het 1 keer per dag moet nemen: neem het dan bij het ontbijt.
- Als u het 2 keer per dag moet nemen: neem het dan bij het ontbijt en bij het avondeten.
- Als u het 3 keer per dag moet nemen: neem het dan bij het ontbijt, bij het middagen en bij het avondeten.

Het is belangrijk om dit geneesmiddel **elke dag** te nemen. Enkel zo verlaagt het uw kans op schade door diabetes, zoals: hart- en vaatziekten, nierproblemen, wonden die slecht genezen, zenuwpijn en blindheid.

Belangrijk om te weten



Drink geen grote hoeveelheden alcohol. Want dit kan samen met dit geneesmiddel een ernstige verstoring in het bloed veroorzaken (lactatacidose). Af en toe 1 of 2 glazen alcohol drinken is geen probleem.



Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Bespreek dan met uw arts of u dit geneesmiddel mag gebruiken.



U kan veilig borstvoeding geven als u dit geneesmiddel gebruikt.

Bijwerkingen

De meeste mensen hebben geen bijwerkingen.

De bijwerkingen die het meest voorkomen zijn:

- **Maagdarmklachten** (zoals diarree, misselijkheid, braken): dit komt vooral in het begin van de behandeling voor. Neem de tablet tijdens of vlak na de maaltijd. Dan veroorzaakt het minder maagdarmklachten.
- **Minder eetlust.**

Maakt u zich zorgen? Bespreek dit met uw arts of apotheker.

Wat moet ik doen als ik mijn geneesmiddel ben vergeten nemen?

- U gebruikt dit geneesmiddel **1 keer per dag**: Neem de vergeten tablet bij de eerstvolgende maaltijd. Dus bij het middagen of avondeten. Ontdekt u het pas na het avondeten? Sla de vergeten tablet dan over.
- U gebruikt dit geneesmiddel **2 keer per dag**: Neem de tablet die u 's morgens bent vergeten alsnog bij het middagen. Ontdekt u het pas na het middagen, sla de vergeten ochtendtablet dan over. Bent u de tablet bij de avondmaaltijd vergeten? Neem hem dan toch nog met wat voedsel in.
- U gebruikt dit geneesmiddel **3 keer per dag**: Neem de vergeten tablet dan alsnog in met wat voedsel. Ontdekt u het pas als het al tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet dan over.

Pas op met deze geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen ook een invloed hebben op dit geneesmiddel. Als u geneesmiddelen zonder voorschrift koopt, vertel dit dan aan uw apotheker. Dan kan deze controleren of u ze veilig samen kan gebruiken.

Meer weten?

Bij twijfel, praat met uw arts of apotheker. Kijk in de bijsluiter voor extra informatie.